

## OSELTAMIVIR : SA PLACE AUJOURD'HUI

SYMPTÔMES < 48H  
ET  
PATIENT A RISQUE DE FORME GRAVE

	CURATIF	PRÉ-EMPTIF (CONTACT AVÉRÉ)	PROPHYLAXIE
POPULATION CIBLE	>1 AN à RISQUE DE COMPLICATION OU FORME GRAVE D'EMBLÉE	IMMUNODÉPRIMÉ OU A RISQUE DE FORME GRAVE	EHPAD RISQUE DE FORMES GRAVES
POSOLOGIE	75 MG/12H 5 JOURS 75 MG/12H 10 JOURS	75 MG / 24H 10 JOURS	75 MG / 24H

✳ SUR AVIS SPÉCIALISÉ ET PLURIDISCIPLINAIRE

✳✳ à ADAPTER à LA FONCTION RÉNALE :



30-60 mL/MN => 30 MG/12H (CURATIF) OU /24H (AUTRES INDICATIONS)  
10-30 mL/MN => 30 MG/24H (CURATIF) OU /48H (AUTRES INDICATIONS)



PENDANT UN REPAS  
=> MEILLEURE TOLÉRANCE



PAS D'INTERACTION  
MÉDICAMENTEUSE NOTABLE



ALTERNATIVE :  
SOLUTION BUVABLE

PREVENTION : L'OSELTAMIVIR NE SE SUBSTITUE PAS  
- à LA VACCINATION   
- AUX GESTES BARRIÈRES  

